

別表3 有用郷土樹種詳細一覧表

種名	科名	(1) 姿			(2) 生育地			(3) 出現		(4) 生育条件			(5) 根系分布	(6) 植樹適期	(7) 利用						(8) 特徴	
		常落	樹高	樹形型	気候	適応土壌	土性区分	場所	遷移	利用光	水分要求	耐アルカリ性			林地	開発裸地	街なか緑地				花実	特記事項
																	公園	街路樹	庭木	生垣		
アオキ	ミズキ科	常	低木	株立ち	温	発酵	埴壤	林内	後期	弱	中	大	浅根	6・10月	○	×	○	×	○	×	赤	鹿の嗜好性植物
アオハダ	モチノキ科	落	亜高木	他形	温	浄発	壤土	林内	後期	強弱	中	中	浅根	3・11月	▲	×	○	×	○	×	赤	尾根・浅土
アカガシ	ブナ科	常	高木	他形	温	浄発	埴壤	林内	後期	強弱	小	中	中間	6月	○	×	○	×	○	×		高い山に多い・ブナと混生
アカシデ	カバノキ科	落	高木	他形	温	浄発	壤土	林内	後期	強	小	中	浅根	2・12月	○	×	○	×	○	×		斜面上部
アカマツ	マツ科	常	高木	自→他	温	合浄	砂壤	林内	先駆	強	小	中	深根	3・11月	○	○	○	×	○	×		合成～浄菌
アカメガシワ	トウダイグサ科	落	亜高木	他形	温	浄発	壤土	林縁	先駆	強	小	大	浅根	3・11月	○	○	○	×	×	×		荒れ地・ロープ根・根萌芽
アキグミ	グミ科	落	低木	他形	暖	合成	砂壤	林縁	先駆	強	小	大	浅根	3・11月	○	○	○	×	×	×	赤	放線菌と共生
アキニレ	ニレ科	落	亜高木	自→他	暖	合発	埴壤	林外	先駆	強	中	大	浅根	11月	×	○	○	×	○	×		崩積土・運積土に適応
アコウ	クワ科	常	亜高木	他形	海	合成	砂壤	林外	先駆	強	小	大	浅根	6・9月	×	×	○	○	○	○		移入種（南西諸島）
アセビ	ツツジ科	常	低木	株立ち	温	浄発	壤土	林内・外	中期	強弱	小	中	浅根	4・6月	○	×	○	×	○	○		有毒植物（牛洗い）
アベマキ	ブナ科	落	高木	自形	暖	浄発	埴壤	林内	前期	強	小	中	深根	3・11月	▲	×	○	×	×	×	茶	多雨地は好まない
アラカシ	ブナ科	常	亜高木	他形	暖	発酵	壤土	林内	中期	強弱	中	中	中間	6月	○	×	○	×	○	○		カシ類でも最も強健
イイギリ	イイギリ科	落	亜高木	自形	温	浄発	壤土	林縁	前期	強	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	×	×	赤	整った樹形・下駄
イスノキ	マンサク科	常	高木	他形	温	合発	壤土	林内	中期	強弱	中	大	中間	6・10月	○	×	○	○	○	×	紅	春花が美しい
イタヤカエデ	カエデ科	落	高木	自形	冷	発酵	壤土	林内	中期	中	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	×	×	赤	メーブルシロップ
イチイガシ	ブナ科	常	高木	自形	暖	発酵	壤土	林内	後期	弱	中	中	深根	6月	○	×	○	×	×	×		照葉樹林代表種
イヌシデ	カバノキ科	落	高木	他形	温	発酵	壤土	林内	中期	強弱	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	×		モミジに似た樹皮
イヌツゲ	モチノキ科	常	低木	株立ち	暖	発酵	砂壤	林外	中期	強弱	中	大	浅根	6・10月	○	×	○	○	○	○	淡黄	剪定に強い
イヌブナ	ブナ科	落	高木	自形	冷	発酵	埴壤	林内	中期	弱	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	×	×		
イヌマキ	マキ科	常	高木	自形	暖	浄発	砂壤	林内	中期	強弱	中	大	深根	6・10月	○	×	○	×	○	○		斜面に強い
イロハモミジ	カエデ科	落	高木	他形	温	浄発	壤土	林縁	後期	中	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	×	紅	本来は石目で
ウツギ	ユキノシタ科	落	低木	株立ち	暖	合成	壤土	林外	先駆	強	小	中	深根	3月	○	○	○	×	○	○	白	強健な先駆種
ウバメガシ	ブナ科	常	亜高木	他形	暖	浄菌	砂壤	林内	中期	強	小	大	深根	6月	○	×	○	○	○	○		耐乾性あり
ウメモドキ	モチノキ科	落	低木	他形	温	浄発	壤土	林外	中期	強	大	中	浅根	3月	▲	×	○	×	○	×	赤	小鳥が好きな果実

別表3 有用郷土樹種詳細一覧表

種名	科名	(1) 姿			(2) 生育地			(3) 出現		(4) 生育条件			(5) 根系分布	(6) 植樹適期	(7) 利用						(8) 特徴	
		常落	樹高	樹形型	気候	適応土壌	土性区分	場所	遷移	利用光	水分要求	耐アルカリ性			林地	開発裸地	街なか緑地				花実	特記事項
																	公園	街路樹	庭木	生垣		
ウラジロガシ	ブナ科	常	高木	自形	温	浄発	壤土	林内	中期	弱	中	中	中間	6月	○	×	○	×	○	×		
ウラジロノキ	バラ科	落	亜高木	自形	温	浄発	壤土	林縁	中期	中	中	—	—	3・11月	○	×	○	×	○	×	赤	
ウリカエデ	カエデ科	落	亜高木	他形	温	浄発	壤土	林縁	前期	中	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	×		マサ土に適する
ウリハダカエデ	カエデ科	落	亜高木	他形	温	合浄	壤土	林内	前期	中	中	中	浅根	3・11月	○	○	○	×	○	×		切土でもよく伸びる
ウワミズザクラ	バラ科	落	高木	他形	温	合発	壤土	林縁	先駆	中	中	中	浅根	3・11月	▲	×	○	×	○	×	白	窒素要求大
エゴノキ	エゴノキ科	落	亜高木	自→他	温	浄発	壤土	林縁	中期	中	中	大	浅根	3・11月	○	×	○	○	○	×	白	庭木に使いやすい
エドヒガン	バラ科	落	高木	他形	温	合発	壤土	林内	前期	強	中	中	中間	3・11月	▲	×	○	×	×	×	白	長寿の樹種・高野山に自生
エノキ	ニレ科	落	高木	他形	暖	合発	埴壤	林外	先駆	強	中	大	浅根	3月	×	○	○	○	×	×		森林に少・ロープルート
オオバアサガラ	エゴノキ科	落	亜高木	他形	冷	発酵	壤土	林縁	中期	中	大	中	浅根	3・11月	▲	×	○	×	○	×	白	
オオモミジ	カエデ科	落	亜高木	他形	冷	浄発	壤土	林縁	後期	弱	中	中	浅根	3・11月	▲	×	○	×	○	×		組み合わせで用いる
オガタマノキ	モクレン科	落	高木	自→他	暖	発酵	砂壤	林縁	中期	強	中	中	中間	6月	▲	×	○	×	○	×	淡黄	神社に植栽・野生稀
オニグルミ	クルミ科	落	高木	自形	温	合成	壤土	林縁	前期	強	中	中	中間	3・11月	○	×	○	×	×	×	緑	樹形は粗い・アレロパシーあり
カキノキ	カキノキ科	落	亜高木	他形	暖	浄発	砂壤	林縁	前期	強	中	大	中間	3・11月	○	×	○	×	○	×	橙	ヤマガキとの区別困難
カクレミノ	ウコギ科	常	亜高木	他形	海	発酵	壤土	林内	後期	弱	中	大	深根	6月	○	×	○	×	○	×		強光ではいじける
カゴノキ	クスノキ科	常	高木	他形	暖	浄発	壤土	林内	中期	弱	中	中	—	6月	○	×	○	×	×	×		樹皮の模様が面白い
カツラ	カツラ科	落	高木	自形	温	合発	砂壤	林内	前期	強弱	大	中	深根	2・11月	▲	×	○	○	×	×		健康株は樹幹から萌芽
カナクギノキ	クスノキ科	落	高木	自形	温	浄発	壤土	林縁	前期	中	中	中	中間	3月	○	×	○	×	×	×	淡黄	シカ食害に強い
カナメモチ	バラ科	常	亜高木	他形	暖	浄発	埴壤	林内	中期	中	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	○	赤	
ガマズミ	スイカズラ科	落	低木	株立ち	暖	発酵	壤土	林縁	前期	強	中	中	中間	3・11月	▲	×	○	×	○	×	白・赤	赤い実が美しい
カマツカ	バラ科	落	低木	株立ち	温	発酵	壤土	林内	前期	中	中	—	—	3・11月	○	×	○	×	○	○	白・赤	赤い実が美しい
カヤ	イチイ科	常	高木	自形	温	浄発	壤土	林内	中期	強弱	中	中	深根	2月	○	×	○	×	○	×		ときおり高木に・基盤
カワラハンノキ	カバノキ科	落	亜高木	他形	温	合成	壤土	林外	先駆	強	大	中	浅根	3月	○	×	○	×	×	×		
キハダ	ミカン科	落	高木	自形	冷	発酵	砂壤	林内	中期	強弱	中	中	深根	3月	▲	×	○	×	×	×		薬用の高木・肥沃地好む
キリ	ノウゼンカズラ科	落	高木	自形	温	合成	砂壤	林外	先駆	強	中	中	中間	3・11月	○	○	○	×	×	×	紫	

別表3 有用郷土樹種詳細一覧表

種名	科名	(1) 姿			(2) 生育地			(3) 出現		(4) 生育条件			(5) 根系分布	(6) 植樹適期	(7) 利用						(8) 特徴	
		常落	樹高	樹形型	気候	適応土壌	土性区分	場所	遷移	利用光	水分要求	耐アルカリ性			林地	開発裸地	街なか緑地				花実	特記事項
																	公園	街路樹	庭木	生垣		
クサギ	クマツズラ科	落	亜高木	株立ち	温	合成	壤土	林外	先駆	強	中	中	浅根	3・11月	○	○	×	×	×	×	白・紫	
クスノキ	クスノキ科	常	高木	他形	暖	合発	壤土	林内	中期	中	中	大	中間	4月	×	×	○	○	×	×		古い時代の移入種植栽時、葉を2/3以上落とすこと
クちなし	アカネ科	常	低木	株立ち	暖	浄発	壤土	林縁	中期	強弱	中	大	浅根	6月	○	×	○	○	○	○	白	黄色の染料になる
クヌギ	ブナ科	落	高木	自形	暖	発酵	埴壤	林内	前期	強	中	中	深根	3・11月	○	×	○	×	×	×		多雨地は好まない
クマシデ	カバノキ科	落	高木	他形	温	発酵	壤土	林縁	中期	中	大	中	深根	3・11月	○	×	○	×	×	×		谷あいを好むシデ
クマノミズキ	ミズキ科	落	高木	自形	暖	合浄	埴壤	林外	先駆	強	中	中	浅根	3・11月	○	○	○	×	×	×	白	暖地に耐える
クリ	ブナ科	落	高木	他形	温	合発	砂壤	林内	後期	強	中	中	深根	3・11月	○	×	○	×	×	×	茶	土木用材・食用
クロガネモチ	モチノキ科	常	高木	自一他	暖	発酵	砂壤	林内	中期	中	中	大	浅根	6・10月	○	×	○	○	○	×	赤	粘土に強い
クロバイ	ハイノキ科	常	亜高木	自形	海	浄発	壤土	林内	前期	強	小	—	—	6・7月	○	×	○	○	×	×	白	5月に花が美しい
クロマツ	マツ科	常	高木	自一他	海	合浄	砂壤	林内	先駆	強	小	大	深根	3月	○	○	○	○	○	×		合成～浄菌
クロモジ	クスノキ科	落	低木	株立ち	温	発酵	壤土	林内	中期	中	中	中	中間	3月	○	×	○	×	○	×		強光では育成困難
ケヤキ	ニレ科	落	高木	自形	温	発酵	埴壤	林内	中期	中	中	中	浅根	3月	○	×	○	○	×	×		本来は崖地が適地
ケンボナシ	クロウメモドキ科	落	高木	自形	温	発酵	埴壤	林内	中期	中	中	—	—	3・11月	▲	×	○	×	×	×		食用
コアジサイ	ユキノシタ科	落	低木	株立ち	冷	発酵	埴壤	林内	中期	中	大	中	深根	3月	▲	×	○	×	○	○	紫	湿地好む
コウヤマキ	コウヤマキ科	常	高木	自形	温	浄菌	砂壤	林内	後期	中	中	大	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	×		世界三大庭園樹
コウヤミズキ	マンサク科	落	低木	株立ち	冷	合発	砂壤	林縁	中期	中	中	中	浅根	3月	▲	×	○	×	○	×	薄黄	春花が美しい
コシアブラ	ウコギ科	落	高木	他形	温	浄発	壤土	林内	中期	中	中	中	深根	3・10月	○	×	○	×	○	×		中辺路以北・尾根の土溜まり
コックバネウツギ	スイカズラ科	落	低木	株立ち	冷	浄発	壤土	林内	前期	中	中	中	中間	3・11月	▲	×	○	×	○	○	白	
コナラ	ブナ科	落	高木	他形	暖	浄発	壤土	林内	前期	強	中	中	深根	3・11月	○	×	○	×	×	×		紀北里山代表種
コハウチワカエデ	カエデ科	落	高木	他形	冷	浄発	壤土	林内	後期	中	中	中	浅根	3・11月	▲	×	○	×	○	×		暑さに弱いが森の骨格を作る
コバノガマズミ	スイカズラ科	落	低木	株立ち	暖	合浄	壤土	林縁	前期	強	小	中	中間	3・11月	▲	×	○	×	○	○	白・赤	乾燥に強いガマズミ
コバンモチ	ホルトノキ科	常	高木	自形	暖	浄発	壤土	林内	後期	中	中	—	—	6・10月	▲	×	○	×	○	×		艶のある葉が美しい
コマユミ	ニシキギ科	落	低木	株立ち	温	浄発	壤土	林内	中期	中	中	中	浅根	3・11月	▲	×	○	×	○	○	赤	紅葉美しい
ゴヨウツツジ	ツツジ科	落	亜高木	他形	冷	浄発	壤土	林内	前期	強弱	小	中	浅根	3・11月	▲	×	○	×	○	×	白	護摩壇山に純林

別表3 有用郷土樹種詳細一覧表

種名	科名	(1) 姿			(2) 生育地			(3) 出現		(4) 生育条件			(5) 根系分布	(6) 植樹適期	(7) 利用						(8) 特徴	
		常落	樹高	樹形型	気候	適応土壌	土性区分	場所	遷移	利用光	水分要求	耐アルカリ性			林地	開発裸地	街なか緑地				花実	特記事項
																	公園	街路樹	庭木	生垣		
ゴヨウマツ	マツ科	常	高木	自一他	冷	浄菌	砂壤	林内	後期	強	小	中	深根	3月	○	×	○	×	×	×		
ゴンズイ	ミツバウツギ科	落	亜高木	自形	暖	浄発	壤土	林内	前期	強	中	中	—	3・11月	▲	×	○	×	○	×	赤	
ザイフリボク	バラ科	落	亜高木	自形	温	浄発	壤土	林内	前期	中	中	中	—	3・11月	▲	×	○	×	○	×	白	美しい花木
サカキ	ツバキ科	常	亜高木	自一他	暖	発酵	砂壤	林内	後期	弱	中	中	浅根	5・6月	○	×	○	×	○	○		神前にお供え
サツキ	ツツジ科	常	低木	株立ち	温	浄発	壤土	林外	中期	強	大	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	○	紅	溪流の岩場に自生
サワグルミ	クルミ科	落	高木	自形	冷	発酵	埴壤	林内	後期	強中	大	中	中間	3・11月	▲	×	○	×	×	×		
サワシバ	カバノキ科	落	高木	他形	冷	発酵	壤土	林内	中期	中	大	中	浅根	2・12月	▲	×	○	×	×	×		
サンショウ	ミカン科	落	低木	他形	温	発酵	埴壤	林内	中期	中	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	×		和歌山県は日本一の産地
シオジ	モクセイ科	落	高木	自形	冷	発酵	砂壤	林内	後期	中	大	中	深根	3・11月	▲	×	○	×	×	×		
シキミ	シキミ科	常	亜高木	自形	暖	発酵	埴壤	林内	中期	中	中	中	中間	6・10月	○	×	○	×	×	×		仏花
シナノガキ	カキノキ科	落	亜高木	他形	暖	浄発	砂壤	林縁	前期	強	中	大	中間	3・11月	▲	×	○	×	○	×	橙	
シャリンバイ	バラ科	常	低木	株立ち	海	合発	砂壤	林外	中期	強	小	大	—	5~9月	○	×	○	○	○	○	白	
シラカシ	ブナ科	常	高木	他形	暖	発酵	壤土	林内	後期	強弱	中	中	深根	6月	○	×	○	×	○	×		人が増やしたカシ高木
シリブカガシ	ブナ科	常	高木	他形	暖	発酵	壤土	林内	後期	強	中	中	深根	6月	○	×	○	×	○	×		生育地は局所的
シロダモ	クスノキ科	常	亜高木	他形	暖	発酵	壤土	林内	後期	強弱	中	大	中間	3月	○	×	○	○	○	×		耐陰性がある
シロバイ	ハイノキ科	常	亜高木	自形	暖	浄発	壤土	林内	中期	弱	中	—	—	6・7月	○	×	○	○	×	×	白	5月に花が美しい
シロモジ	クスノキ科	落	低木	株立ち	冷	浄発	壤土	林縁	中期	中	中	中	中間	3月	○	×	○	×	○	×		樹姿、葉形が好まれる
スギ	スギ科	常	高木	自形	温	浄発	埴壤	林内	中期	強弱	大	中	深根	3・11月	○	×	○	×	×	○		建築材
スダジイ	ブナ科	常	高木	他形	海	発酵	埴壤	林内	前期	強	中	大	深根	6月	○	×	○	×	×	×		ツブラジイより適応範囲広い
センダン	センダン科	落	高木	自形	暖	合発	砂壤	林縁	先駆	強	中	大	中間	3・11月	○	○	○	○	×	×	紫	紫の花がきれい
センリョウ	センリョウ科	常	低木	株立ち	暖	発酵	壤土	林内	中期	弱	中	—	—	3・6・9月	○	×	○	×	○	×	赤	庭の片隅に
ソヨゴ	モチノキ科	常	亜高木	自一他	温	浄発	壤土	林内	中期	強	中	中	浅根	6月	○	×	○	×	○	×	赤	粘土に強い
タイミンタチバナ	ヤブコウジ科	常	亜高木	自形	海	発酵	埴壤	林内	中期	弱	大	中	—	6月	○	×	○	×	○	×		
タカノツメ	ウコギ科	落	高木	自形	温	浄発	壤土	林縁	前期	中	中	中	深根	3・11月	○	×	○	×	○	×		根貧弱・強光に弱い

別表3 有用郷土樹種詳細一覧表

種名	科名	(1) 姿			(2) 生育地			(3) 出現		(4) 生育条件			(5) 根系分布	(6) 植樹適期	(7) 利用						(8) 特徴	
		常落	樹高	樹形型	気候	適応土壌	土性区分	場所	遷移	利用光	水分要求	耐アルカリ性			林地	開発裸地	街なか緑地				花実	特記事項
																	公園	街路樹	庭木	生垣		
タブノキ	クスノキ科	常	高木	他形	暖	発酵	壤土	林内	後期	中	中	大	中間	6~7月	○	×	○	○	×	×		線香の材料
タムシバ	モクレン科	落	亜高木	自一他	冷	浄発	壤土	林縁	前期	強	中	中	中間	3月	▲	×	○	×	○	×	白	白い花が美しい
タラヨウ	モチノキ科	常	亜高木	自一他	暖	発酵	壤土	林内	後期	弱	中	大	深根	6月	▲	×	○	○	○	×	赤	
ツガ	マツ科	常	高木	自形	冷	浄発	壤土	林内	後期	中	中	低	浅根	2月	○	×	○	×	×	×		岩目に強い
ツクバネウツギ	スイカズラ科	落	低木	株立ち	温	浄発	壤土	林内	前期	中	中	中	中間	3・11月	○	×	○	×	○	○	白	
ツクバネガシ	ブナ科	常	高木	他形	温	発酵	壤土	林内	後期	強弱	中	中	中間	6月	○	×	○	×	○	×		
ツブラジイ	ブナ科	常	高木	他形	暖	発酵	壤土	林内	前期	強弱	中	大	深根	6月	○	×	○	×	×	×		粘土質の残積土でも育つ
ドウダンツツジ	ツツジ科	落	低木	株立ち	冷	浄発	壤土	林外	前期	強中	小	中	浅根	3・11月	▲	×	○	×	○	×	白	
トガサワラ	マツ科	常	高木	自形	冷	合浄	壤土	林内	前期	強弱	小	低	浅根	2月	○	×	○	×	×	×		植栽地域要限定
トチノキ	トチノキ科	落	高木	他形	温	発酵	壤土	林内	後期	中	中	中	深根	3・11月	○	×	○	○	×	×	白	大高木の代表・木材・蜂蜜
トベラ	トベラ科	常	低木	株立ち	海	合発	壤土	林縁	中期	強	小	大	浅根	10月	○	×	○	○	○	○	白	海岸沿い
ナギ	マキ科	常	亜高木	自形	暖	浄発	壤土	林内	中期	弱	中	大	深根	6月	×	×	○	○	×	×		移入種（自生地不明）
ナツツバキ	ツバキ科	落	高木	自形	冷	浄発	壤土	林内	前期	中	中	大	浅根	3・6月	▲	×	○	○	○	×	白	庭木として整った樹姿
ナナカマド	バラ科	落	高木	他形	冷	合浄	埴壤	林内	先駆	強	中	中	浅根	3月	▲	×	○	×	○	×	白・赤	浄菌であれば暖地でも
ナナミノキ	モチノキ科	常	高木	自一他	暖	発酵	埴壤	林内	中期	弱	中	中	浅根	6・10月	▲	×	○	×	×	×	赤	林縁の常緑高木
ナワシログミ	グミ科	常	低木	他形	暖	合成	砂壤	林縁	先駆	強	小	大	浅根	3・6月	○	○	○	×	×	×	赤	放線菌と共生
ナンキンナナカマド	バラ科	落	低木	株立ち	温	浄発	壤土	林縁	先駆	強	中	中	浅根	3月	▲	×	○	×	○	×	赤	
ニワトコ	スイカズラ科	落	低木	他形	温	発酵	埴壤	林縁	先駆	中	大	中	深根	3・11月	○	×	○	×	×	×		新芽は食べることができる
ヌルデ	ウルシ科	落	亜高木	自形	温	浄発	壤土	林縁	先駆	強	小	大	浅根	3・11月	○	○	×	×	×	×		かぶれ毒性小
ネジキ	ツツジ科	落	亜高木	他形	温	浄菌	壤土	林縁	前期	弱	中	中	—	3・11月	○	×	○	×	○	×	白	浄菌の残る里山で育つ
ネズミサシ	ヒノキ科	常	亜高木	自形	暖	浄菌	砂壤	林縁	先駆	強	小	大	浅根	3月	○	○	○	×	×	×		
ネズミモチ	モクセイ科	常	亜高木	他形	暖	発酵	壤土	林内	中期	強弱	小	大	浅根	6・10月	○	×	○	×	○	×		鳥によって増えすぎた
ネムノキ	マメ科	落	亜高木	他形	暖	合成	埴壤	林縁	先駆	強	中	大	中間	3・11月	○	○	○	×	×	×	桃	根の切断はよくない・根粒菌
ノグルミ	クルミ科	落	高木	他形	暖	浄発	砂壤	林縁	先駆	強	小	大	浅根	3・11月	○	○	○	×	×	×		

別表3 有用郷土樹種詳細一覧表

種名	科名	(1) 姿			(2) 生育地			(3) 出現		(4) 生育条件			(5) 根系分布	(6) 植樹適期	(7) 利用						(8) 特徴	
		常落	樹高	樹形型	気候	適応土壌	土性区分	場所	遷移	利用光	水分要求	耐アルカリ性			林地	開発裸地	街なか緑地				花実	特記事項
																	公園	街路樹	庭木	生垣		
ノリウツギ	ユキノシタ科	落	低木	他形	温	浄発	壤土	林縁	先駆	中	大	大	深根	11月	○	×	○	×	○	○	白	地下水好む
バイカウツギ	ユキノシタ科	落	低木	株立ち	暖	発酵	壤土	林縁	先駆	中	大	中	深根	3月	▲	×	○	×	○	○	白	花が美しい
ハギ類	マメ科	落	低木	株立ち	温	合成	埴壤	林外	先駆	強	小	中	中間	3・11月	×	○	○	×	○	×	桃	根に根粒菌
ハゼノキ	ウルシ科	落	高木	自形	暖	合成	壤土	林内	先駆	強	中	中	中間	3・11月	▲	○	×	×	×	×		かぶれ毒性小・移入種(南西諸島)
ハマヒサカキ	ツバキ科	常	低木	株立ち	暖	合発	砂壤	林外	先駆	強	小	大	浅根	6・10月	○	×	○	○	○	○		乾いた海辺岩壁に
ハマボウ	アオイ科	落	低木	株立ち	海	発酵	砂壤	汽水域	先駆	強	大	大	浅根	11月	×	×	○	×	○	○	黄	夏、美しい花・庭木に耐える
ハリギリ	ウコギ科	落	高木	自形	冷	発酵	壤土	林内	前期	強	中	中	深根	3・11月	○	×	○	×	×	×		シナ合板
ハンノキ	カバノキ科	落	高木	自形	暖	合成	埴壤	林内	先駆	強	大	中	浅根	3月	○	過湿地緑化	○	×	×	×		水田放棄地にも育つ
ヒイラギ	モクセイ科	常	低木	他形	暖	発酵	壤土	林内	後期	強弱	中	大	浅根	6月	○	×	○	×	○	○	白	老木の葉は丸くなる
ヒサカキ	ツバキ科	常	低木	自一他	温	浄発	壤土	林内	中期	中	小	大	浅根	6・10月	○	×	○	×	○	○		里山でよく見かける
ヒノキ	ヒノキ科	常	高木	自形	温	浄発	壤土	林内	中期	強弱	小	中	浅根	3月	○	×	○	×	×	×		代表的植林樹種
ヒメシャラ	ツバキ科	落	高木	他形	冷	浄発	壤土	林内	先駆	強弱	中	中	浅根	3・11月	○	○	○	×	○	×	白	先駆種
ヒメユズリハ	ユズリハ科	常	高木	他形	海	発酵	壤土	林縁	中期	弱	小	大	浅根	6月	○	×	○	×	○	×		
ビャクシン	ヒノキ科	常	亜高木	自形	海	浄菌	砂壤	林外	中期	強	小	大	浅根	3月	×	×	○	○	○	×		乾燥に強い
フサザクラ	フサザクラ科	落	亜高木	自形	温	発酵	埴壤	林縁	先駆	強	大	中	浅根	3月	▲	×	○	×	○	×		溪流沿いを好む
ブナ	ブナ科	落	高木	自形	冷	発酵	埴壤	林内	後期	強弱	中	中	浅根	3・11月	▲	×	○	×	×	×		植栽はブナ帯だけで
ハウノキ	モクレン科	落	高木	自形	温	合発	壤土	林内	中期	弱	大	中	中間	3・11月	○	×	○	×	×	×	白	暖地では樹勢が痩せる
ホルトノキ	ホルトノキ科	常	亜高木	自形	海	発酵	壤土	林内	後期	強弱	中	大	深根	6月	○	×	○	○	○	×	白	狭い亀裂には入らず石を抱く
ホンシャクナゲ	ツツジ科	常	低木	株立ち	温	浄菌	砂壤	林内	中期	弱	中	大	浅根	4・5月	○	×	○	×	○	×	桃	
マサキ	ニシキギ科	常	低木	株立ち	海	浄発	壤土	林縁	中期	強	小	大	浅根	4月	○	×	○	×	○	○	赤	
マユミ	ニシキギ科	落	亜高木	他形	温	浄発	砂壤	林内	後期	中	中	中	—	3・11月	○	×	○	×	○	×	赤	赤い実美しい
マルバアオダモ	モクセイ科	落	亜高木	自一他	暖	浄発	壤土	林内	中期	強弱	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	×	白	海沿いの里山に多い
マンサク	マンサク科	落	低木	株立ち	冷	浄発	砂壤	林内	中期	中	中	中	浅根	3月	▲	×	○	×	○	×	黄	春花が美しい
マンリョウ	ヤブコウジ科	常	低木	自形	暖	発酵	壤土	林内	後期	弱	中	中	浅根	6月	○	×	○	×	○	×	赤	樹高50cm

別表3 有用郷土樹種詳細一覧表

種名	科名	(1) 姿			(2) 生育地			(3) 出現		(4) 生育条件			(5) 根系分布	(6) 植樹適期	(7) 利用						(8) 特徴	
		常落	樹高	樹形型	気候	適応土壌	土性区分	場所	遷移	利用光	水分要求	耐アルカリ性			林地	開発裸地	街なか緑地				花実	特記事項
																	公園	街路樹	庭木	生垣		
ミズキ	ミズキ科	落	高木	自一他	冷	発酵	埴壤	林内	中期	中	大	中	浅根	3・11月	○	○	○	×	×	×	白	樹形に特徴
ミズナラ	ブナ科	落	高木	他形	冷	合発	壤土	林内	前期	中	中	中	深根	3月	○	×	○	×	×	×		近年日本海側で害虫増加
ミズメ	カバノキ科	落	高木	自形	冷	浄発	砂壤	林内	前期	中	中	中	浅根	3月	▲	×	○	×	×	×		サロメチール臭
ミツバツツジ類	ツツジ科	落	低木	株立ち	温	浄菌	壤土	林内	前期	中	中	中	浅根	3・11月	▲	×	○	×	○	×	桃	トハミツバツツジ・コハミツバツツジ含む
ミミズバイ	ハイノキ科	常	垂高木	他形	海	発酵	壤土	林内	中期	小	強	中	—	6・7月	○	×	○	×	×	×		
ミヤマガマズミ	スイカズラ科	落	低木	株立ち	暖	浄発	壤土	林内	前期	中	小	—	—	3・11月	▲	×	○	×	×	×	白・赤	赤い実が美しい
ムクノキ	ニレ科	落	高木	自一他	暖	発酵	埴壤	林外	先駆	強	中	中	浅根	3月	×	○	○	○	×	×		森林に少・ロープルート
ムクロジ	ムクロジ科	落	高木	自形	暖	発酵	埴壤	林内	先駆	強	大	大	深根	3・11月	×	×	○	×	×	×		
ムラサキシキブ	クマツズラ科	落	低木	株立ち	暖	合発	砂壤	林内	中期	中	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	×	紫	コムラサキと区別する
モチツツジ	ツツジ科	落	低木	株立ち	暖	浄発	壤土	林内	前期	強中	中	中	浅根	5・6月	▲	×	○	×	○	×	桃	紀ノ川下流域の里山に多い
モチノキ	モチノキ科	常	垂高木	他形	海	発酵	壤土	林内	後期	強弱	中	大	浅根	6月	○	×	○	○	○	×	赤	
モッコク	ツバキ科	常	垂高木	自一他	海	発酵	壤土	林内	後期	中	中	大	浅根	6・7月	○	×	○	○	○	×		乾燥に強く、樹姿よし
モミ	マツ科	常	高木	自形	温	浄発	壤土	林内	後期	中	中	低	深根	3月	○	×	○	×	×	×		増やしたい針葉樹
ヤツデ	ウコギ科	常	低木	株立ち	暖	発酵	壤土	林内	後期	弱	中	大	浅根	6月	×	×	○	×	○	×		鳥により自然に侵入
ヤブコウジ	ヤブコウジ科	常	低木	株立ち	温	発酵	砂壤	林内	後期	弱	中	中	浅根	6月	○	×	○	×	○	×	赤	樹高10cm
ヤブツバキ	ツバキ科	常	垂高木	自一他	暖	発酵	壤土	林内	後期	強弱	中	大	浅根	6・7月	○	×	○	○	○	×	赤	冬に花が美しい
ヤブニッケイ	クスノキ科	常	垂高木	自一他	暖	浄発	埴壤	林内	後期	中	中	大	中間	4・5月	○	×	○	○	○	×		
ヤブムラサキ	クマツズラ科	落	低木	株立ち	暖	合発	壤土	林内	中期	弱	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	×	紫	
ヤマアジサイ	ユキノシタ科	落	低木	株立ち	冷	発酵	埴壤	林縁	先駆	強	大	中	深根	3月	▲	×	○	×	○	×	紫	美しいアジサイ
ヤマウルシ	ウルシ科	落	垂高木	自形	温	浄発	壤土	林縁	前期	強	小	中	中間	3・11月	▲	○	×	×	×	×		かぶれ毒性中
ヤマグルマ	ヤマグルマ科	常	高木	他形	温	浄菌	壤土	林内	中期	強弱	小	中	浅根	6・9月	▲	×	○	×	×	×		
ヤマザクラ	バラ科	落	高木	自形	暖	合発	壤土	林内	前期	強	中	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	×	白	花が美しい
ヤマツツジ	ツツジ科	落	低木	株立ち	温	浄発	壤土	林内	先駆	強	中	大	浅根	3・10月	▲	×	○	×	○	○	紅	地域ごとに違いがある
ヤマナラシ	ヤナギ科	落	高木	自形	温	合発	壤土	林外	先駆	強	小	中	浅根	3月	▲	○	○	×	×	×		樹形・樹皮美しい

別表3 有用郷土樹種詳細一覧表

種名	科名	(1) 姿			(2) 生育地			(3) 出現		(4) 生育条件			(5) 根系分布	(6) 植樹適期	(7) 利用						(8) 特徴	
		常落	樹高	樹形型	気候	適応土壌	土性区分	場所	遷移	利用光	水分要求	耐アルカリ性			林地	開発裸地	街なか緑地				花実	特記事項
																	公園	街路樹	庭木	生垣		
ヤマハゼ	ウルシ科	落	亜高木	自形	温	浄発	壤土	林縁	先駆	強	小	中	中間	3・11月	▲	○	×	×	×	×		かぶれ毒性中
ヤマブキ	バラ科	落	低木	株立ち	温	合発	壤土	林縁	中期	弱	大	中	浅根	11月	○	×	○	×	○	×	黄	5弁が野生種
ヤマボウシ	ミズキ科	落	亜高木	自形	冷	浄発	壤土	林内	中期	中	中	中	浅根	3・11月	▲	×	○	×	○	×	白・赤	谷あいと尾根で育つ
ヤマモモ	ヤマモモ科	常	亜高木	他形	暖	合発	砂壤	林内	中期	強弱	小	大	中間	6・10月	○	×	○	○	×	×	赤	粘土に強い
ユキヤナギ	バラ科	落	低木	株立ち	温	合発	壤土	林外	中期	強	中	中	浅根	3・11月	×	×	○	×	○	×	白	花が美しい
ユズリハ	ユズリハ科	常	亜高木	自一他	冷	発酵	壤土	林内	中期	強	中	大	浅根	6月	○	×	○	×	○	×		葉はしめ縄に・シカ食べない
リョウブ	リョウブ科	落	亜高木	自一他	温	浄発	壤土	林内	中期	強弱	小	中	浅根	3・11月	○	×	○	×	○	×	白	樹形に特徴
リンボク	バラ科	常	亜高木	他形	暖	発酵	壤土	林内	中期	弱	大	中	中間	3月	○	×	○	×	○	×	白	秋に花
ルリミノキ	アカネ科	常	低木	他形	暖	発酵	壤土	林内	中期	弱	中	—	浅根	7月	▲	×	○	×	○	×	青	紫のみ美しい
レンゲツツジ	ツツジ科	落	低木	株立ち	温	浄菌	壤土	林外	先駆	中	中	中	浅根	3月	×	×	○	×	○	×	桃	護摩壇山の株もシカの食害に