

食の安全に関するくわしい内容を知りたい場合は、担当者が出張するなどしてご説明します。 PTA活動や親しいグループの集まりの時などに説明を希望される方は、裏面のお問い合わせ 先までお気軽にお問い合わせ・お申し込みください。

しょくひんひょう じき げんひょう じ食品表示(期限表示)

きげんひょうじ期限表示とは

食品がいつまで食べられるか、いつまで品質が保たれているかを知る首印です。加工食品には、開封前の期限として「消費期限」または「賞味期限」のどちらかが表示されています。



「消費期限」とは?



「期限を過ぎたら食べない方がよい」期限です。





ひょうじれい表示例

ねんがっぴ でまうじ 年月日で表示されています。

- ①消費期限 <u>20XX.12.8</u>、<u>令和X年12月8日</u> など

まも 主な食品 お弁当、おにぎり、サンドイッチ、ケーキ など (品質が早く低下しやすい食品)



「賞味期限」とは?



「おいしく食べることができる」期限です。





うじれい

ねんがっぴ で表示されています。

- ①賞味期限 20XX. 3. 15、 令和X年3月15日 など
- ②賞味期限 20XX. 3、令和X年3月 など
- ※期限が3か月を超えるものは、日を省略することができます。

まも しょくひん 主な食品

スナック菓子、カップめん、缶詰 など ひんしょくひん (品質が比較的長持ちする食品)



賞味期限を過ぎたからといって、すぐに食べられなくなるわけではありません。

アレルギー物質について

アレルギー物質とは

食物アレルギーの患者さんが食べると、かゆみ、じんましんなどの症状から、血圧の低下、 で吸困難などの重い症状まで、さまざまな症状を引き起こす物質のことです。


アレルギーの原因となる食品にはどのようなものがあるの?



アレルギーの原因となる食品はさまざまですが、割合としては、が、クルミ、牛乳、小麦、溶液生が多く、全体の約70%を占めています(右図)。アレルギー症状の発生数が多い食品や、重症になりやすい食品に、アレルギー物質の表示が義務づけられています。

出典:「令和6年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査 研究事業報告書」

(国立病院機構相模原病院) から



アレルギー物質はどのように表示されているの?

アレルギー物質の表示は、表示しなければならない8品首と、表示した方が良い20品首に わかれています。

表示しなければならない品首

クサネニ 「ニッグ ニ センデ タっ ク セヒン 卵、乳、小麦、落花生、そば、えび、かに、くるみ(※) (計8品目)

である。 じ 表示した方が良い品目

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、 キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、ゼラチン、鶏肉、バナナ、 豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご (計20品目)

表示が必要となるのは、容器包装に入れられた加工食品、食品添加物です。

※くるみは令和5年3月9日に「表示した方が良い品目」から「表示しなければならない品目」になりましたが、令和7年3月31日までは移行期間です。 したがって、令和7年3月31日までに製造した食品はくるみが入っていてもアレルギー表示がされていないことがあります。



【個別に表示する場合】

原材料名:小麦粉、砂糖、卵、カスタードクリーム(乳成分を含む)、・・・・・、 イースト/乳化剤(大豆由来)、カゼインNa





原材料名:<mark>小麦粉、砂糖、卵、</mark>カスタードクリーム、・・・・、イースト/乳化剤、カゼインNa、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)


しょくちゅうどくよぼう食中毒予防について


しょくちゅうどく **食中毒とは**

ਫ਼いਫ਼ん 細菌、ウイルス、毒きのこなどの自然毒、化学物質などに汚染された食品を食べることで 生じる下痢、腹痛、発熱、おう吐などの胃腸炎症状を引き起こすことをいいます。 レメイラルラヒン カッ マヒン レメイ ヒ ぱっせい 食中毒は家庭の食事でも発生します。

。 気をつけるのは夏場だけでいいの?

「食中毒」といえば夏に多く発生するイメージがありますが、1年をとおして発生しています。 また、原因もさまざまです。





年間患者数 14.229人(参照:厚生労働省食中毒統計)

食中毒を防ぐにはどうしたらいいの?

はいきん 細菌やウイルスによる食中毒を防ぐために、次の「食中毒予防の3原則」を守りましょう。



①菌をつけない

- □ 食器や調理器具は、十分に洗浄・消毒したものを用いましょう。

②菌を増やさない

- □ 調理は、素早く行いましょう。
- □ 生ものや料理は、早めに食べましょう。
- □ 買い物したらすぐに持ち帰り、冷蔵庫・冷凍庫/ すぐに入れましょう。

③菌をやっつける

- 料理するときは、しっかり加熱しましょう。
- しょっき ちょうり き ぐ ねっとう 食器や調理器具も熱湯などで消毒しましょう。



カンピロバクターについて

カンピロバクターとは

はいます。 はんいん さいまん で はいまん で 生きている 鶏 や牛などのおなかにいます。 はいまた で はいまた で はいまた で はいばん かんせん はいまない で はいばん かんせん はいばん かんせん はいまない で 鶏や牛が感染しても症状は出ませんが、人間が感染すると食中毒になります。



カンピロバクターによる資中毒の特徴は?



■どうやって<mark>感染するの</mark>?

業り 鶏レバーやささみなどの刺身、鶏肉のタタキなどの半生や加熱不十分な鶏肉料理を食べることによって感染します。

- ※カンピロバクターは、少量の菌でも感染します。
- ※市販の鶏肉から高率(20%~100%)でカンピロバクターが検出されています。

■<mark>感染</mark>したらどうなるの?

た 食べてから1~7日で下痢、腹痛、発熱などを起こし、多くは一週間ほどで回復します。 まれに「ギラン・バレー症候群」を発症することもあります。

※ギラン・バレー症候群:手足の麻痺、顔面神経麻痺、呼吸困難などを起こします。

新鮮な鶏肉なら生でも安全に食べられる?



■「新鮮だから生で食べられる」というのは間違いです。

カンピロバクターは、生きている鶏のおなかにいて、解体するときに鶏肉に付着します。 しんせん とりにく 新鮮な鶏肉でもカンピロバクターによる食中毒の危険性はあります。

近年、飲食店において生・半生・加熱不足の鶏肉料理によるカンピロバクター食中毒が多いでは、飲食店ではよく加熱された肉料理を選び、生や十分に加熱されていない 業別は、食べないようにしましょう。



予防するにはどうしたらいいの?



■3ページの「食中毒予防の3原則」で、以下のことに気を付けましょう。

- ・中心温度が75℃以上に1分間以上なるよう十分に加熱しましょう(鶏肉の中心が白くなるまで)。
- ・包丁などの調理器具は生肉用と生野菜用に使い分けて、生肉に付いている菌が生野菜に移らないように注意しましょう。
- ・焼き肉などで肉を焼くときも、調理用の箸と食べる箸を使い分けましょう。


ノロウイルスについて

ノロウイルスとは

冬を中心に発生する感染性胃腸炎の原因となるウイルスの1つで、食中毒の原因にもなります。

はうちえん。ほいくじょこうれいしゃ 幼稚園、保育所、高齢者の施設など多くの ひと せっしょく 人が接触しやすい施設で、ノロウイルスに よる感染症や食中毒が多発しています。

ノロウイルスによる全国の食中毒発生件数(令和6年)



年間発生件数276件(参照:厚生労働省食中毒統計)

ノロウイルスによる感染症・食中毒の特徴は?



■<mark>感染したらどうなるの?</mark>

性き気、おう吐、下痢、発熱などの症状が出ますが、<u>感染しても</u> 症状が出ない人もいます。また、症状がおさまっても、1週間から1か月ほど大量のウイルスが便中に排出され続けます。



がなせんの手指などを介して食品を食べたり、感染した人の ふん使やおう吐物に触れて、感染します。





ノロウイルスに感染しないようにするには?



■衛生的な手洗いをする。

- ・石けんをつけ、手指全体をきっちりと洗いましょう。
- ・手洗い後は、ペーパータオルや清潔なタオルで手をふきましょう。

■食品を十分に加熱する。

・中心温度85℃から90℃で90秒以上加熱して食べましょう。

■おう吐物、便の処理は細心の注意を!

- ・処理をする人が感染しないように、使い捨ての手袋・マスク・エプロンを着用しましょう。
- ・ 汚物は新聞紙などでおおい、その上から消毒液をかけて外側から丁寧に取り除きましょう。また、汚物が付いていた場所も確実に消毒しましょう。

■ 施設の清掃・消毒、調理器具の消毒を行う。

- ・消毒は、塩素系漂白剤が有効です。アルコールはあまり効果がありません。
- えん そ けいのようはくざい つか でき く いるい ねっとう しょうどく 塩素系漂白剤が使えない器具や衣類などは、熱湯で消毒しましょう。

アニサキスについて

アニサキスとは

寄生虫(線虫)の一種で、その幼虫は長さ2~3cm、幅0.5~1mmくらいで白色の太い糸のように見えます。サバ、アジ、サンマなど魚介類に寄生し、寄生している魚介類が死亡し、時間が経過すると内臓から筋肉に移動します。



アニサキスによる食中毒の特徴は?



■どんな症状?

は、ごすうじかん
しゅうすうじかん
食後数時間から十数時間後に、みぞおちの激しい痛み、吐き気、おう吐が生じます。

■どうやって予防するの?

- ・新鮮な魚を購入し、内臓を生で食べないようにしましょう。
- ・丸ごと1匹で購入した際は、速やかに内臓を取り除きましょう。
- ・冷凍(-20℃で24時間以上)や加熱(70℃以上、または60℃なら1分)が有効です。
- ※一般的な料理で使う食酢での処理や塩漬け、醤油やわさびでは死滅しません。

しぜんどく自然毒について



自然毒にはどのようなものがあるの?



ふぐ毒以外に有毒植物(スイセンなど)や貝毒、毒キノコなどがあります。



- ・スイセンは葉がニラとよく似ており、ニラと間違えて食べたことによる食中毒が たびたびはっせい 度々発生しています。
- ・スイセンを食べると、食後30分以内に、吐き気、おう吐、頭痛などの症状が出ます。
- ・食用の野草と確実に判断できない植物は絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしましょう。



- ・ 毒素を含むプランクトンを主に二枚貝(ホタテガイやアサリなど)が食べ、その毒素を蓄積します。その貝類をヒトが食べると中毒症状を起こすことがあります。
- ・この毒成分は熱に強く、加熱調理しても毒性は弱くなりません。


麻痺性貝毒: ふぐ毒と同じぐらいの強さで、全身がしびれ、死亡することもあります。 「リャロッカンとく」「リッカンととなどの症状が出て、3日ぐらいで回復します。

・市場に出回る貝類は、貝毒の基準値を超える場合には出荷規制されていますが、 じしん きいしゅ た きい がら かいどく はっせいじょうほう かくにん 自身で採取して食べる際は必ず貝毒の発生情報を確認してください。



えいせいてき **衛生的な手洗いの方法**





3 よく泡立てる







^て 手のひらと甲(5回ずつ)

りない あば かい **5 指の間(5回ずつ)**

⑥ つめ・指先(5回ずつ)







つめブラシがあったら使ってね

でくび かい **す首(5回ずつ)**

^{みず じゅうぶん} **8 水で十分にすすぐ**

タオルで手をふく







手洗いのときに気をつけることは?

- ・手をふくハンカチやタオルは毎日きれいなもの を持って行きましょう。
- ・ハンカチやタオルは自分専用のものを使いましょう。
- · 爪が長いと汚れが落ちにくくなります。
- · 右けんをよく約立てましょう。
- ・消毒液があるときは使いましょう。

手洗いはどんなときにすればいいの?

- ·ごはんやおやつを食べる前
- ・トイレの後
- ・料理や給食の準備をする前
- ・遊んだ後
- ・家に帰ったとき
- ・動物をさわった後
- ・学校に着いたとき
- そうじ せんたく あと ・掃除や洗濯の後

食の安全・安心わかやま

食の安全・安心に関する内容を随時更新

はくひん。けんさけっか。しょくきゅうさくじょうはっ食品の検査結果や食中毒情報


各種イベントのお知らせなど 食の安全 わかやま 検索

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/

- は、 あんぜん あんしん 食の安全・安心わかやま LINE
- は、 あんぜん あんしん かん きまざま じょうほう はっしん 食の安全・安心に関する様々な情報を発信



とううく **登録はこちら→** 「@988bhgne」で検索 🔳



和歌山県庁 生活衛生課

TEL073-441-2622 FAX073-432-1952

e-mail: e0316001@pref.wakayama.lg.jp

令和7年作成