

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その1)

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和6年	和歌山県	3,317	380.8	8	2,355	270.4	3	888	102.0	7
	全 国	384,111	319.3		226,388	188.2		80,176	66.6	
5年	和歌山県	3,286	371.7	10	2,432	275.1	3	841	95.1	5
	全 国	382,504	315.6		231,148	190.7		75,753	62.5	
4年	和歌山県	3,341	372.9	10	2,277	254.1	6	759	84.7	10
	全 国	385,797	316.1		232,964	190.9		74,013	60.7	
3年	和歌山県	3,297	363.5	11	2,080	229.3	8	713	78.6	11
	全 国	381,505	310.7		214,710	174.9		73,194	59.6	
2年	和歌山県	3,296	359.8	9	2,094	228.6	4	812	88.6	9
	全 国	378,385	306.6		205,596	166.6		78,450	63.6	
元年	和歌山県	3,305	360.0	12	2,278	248.1	1	996	108.5	6
	全 国	376,245	304.2		207,714	167.9		95,518	77.2	
平成30年	和歌山県	3,319	357.3	10	2,250	242.2	3	998	107.4	6
	全 国	373,584	300.7		208,221	167.6		94,661	76.2	
29年	和歌山県	3,287	350.1	10	2,205	234.8	4	1,089	116.0	5
	全 国	373,365	299.5		204,868	164.4		96,859	77.7	
28年	和歌山県	3,329	350.8	10	2,107	222.0	4	1,202	126.7	9
	全 国	373,088	298.4		198,070	158.4		119,346	95.5	
27年	和歌山県	3,405	355.1	9	2,090	218.0	4	1,267	132.1	8
	全 国	370,362	295.5		196,127	156.5		120,959	96.5	
26年	和歌山県	3,406	352.2	7	2,239	231.5	3	1,308	135.3	5
	全 国	368,106	293.5		196,931	157.0		119,652	95.4	
25年	和歌山県	3,451	353.9	6	2,304	236.3	3	1,356	139.1	7
	全 国	364,873	290.3		196,723	156.5		122,969	97.8	
24年	和歌山県	3,394	345.3	6	2,206	224.4	3	1,319	134.2	7
	全 国	360,963	286.6		198,836	157.9		123,925	98.4	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その1)

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	458.0	1 愛媛県	279.0	1 山口県	117.9
	2 青森県	437.4	2 山口県	274.2	2 青森県	117.5
	3 北海道	408.8	3 和歌山県	270.4	3 徳島県	114.6
低 率	45 滋賀県	281.4	45 沖縄県	140.3	45 神奈川県	47.6
	46 東京都	257.1	46 福岡県	137.2	46 東京都	47.4
	47 沖縄県	244.1	47 愛知県	119.9	47 沖縄県	43.1

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和6年	和歌山県 全 国	754 102,821	86.6 85.5	30	2,143 206,887	246.0 172.0	4	439 45,743	50.4 38.0	15
5年	和歌山県 全 国	829 104,533	93.8 86.3	28	1,993 189,919	225.5 156.7	3	447 44,440	50.6 36.7	9
4年	和歌山県 全 国	859 107,481	95.9 88.1	26	1,968 179,529	219.6 147.1	2	435 43,420	48.5 35.6	12
3年	和歌山県 全 国	774 104,595	85.3 85.2	33	1,620 152,027	178.6 123.8	7	428 38,355	47.2 31.2	5
2年	和歌山県 全 国	808 102,978	88.2 83.5	29	1,476 132,440	161.1 107.3	5	357 38,133	39.0 30.9	19
元年	和歌山県 全 国	795 106,552	86.6 86.1	33	1,367 121,863	147.8 98.5	7	399 39,184	43.5 31.7	10
平成30年	和歌山県 全 国	835 108,186	89.9 87.1	34	1,236 109,605	133.0 88.2	8	425 41,238	45.7 33.2	9
29年	和歌山県 全 国	895 109,896	95.3 88.2	30	1,184 101,411	126.1 81.4	7	406 40,332	43.2 32.4	14
28年	和歌山県 全 国	925 109,353	97.5 87.5	30	1,080 92,836	113.8 74.3	6	340 38,314	35.8 30.6	26
27年	和歌山県 全 国	942 111,974	98.2 89.4	29	989 84,819	103.1 67.7	8	336 38,310	35.0 30.6	27
26年	和歌山県 全 国	1,044 114,209	108.0 91.1	20	906 75,391	93.7 60.1	6	359 39,030	37.1 31.1	26
25年	和歌山県 全 国	1,037 118,347	106.4 94.1	24	818 69,720	83.9 55.5	9	381 39,574	39.1 31.5	20
24年	和歌山県 全 国	1,025 121,602	104.3 96.5	30	740 60,719	75.3 48.2	8	398 41,031	40.5 32.6	20

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その2)

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 岩手県	159.8	1 山形県	281.1	1 富山県	60.5
	2 秋田県	154.4	2 秋田県	257.4	2 石川県	59.2
	3 新潟県	127.6	3 静岡県	251.8	3 徳島県	54.9
低 率	45 滋賀県	67.1	45 大阪府	132.6	45 埼玉県	27.1
	46 大阪府	66.5	46 滋賀県	130.6	46 京都府	26.5
	47 東京都	62.3	47 福岡県	120.9	47 沖縄県	19.0

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

		誤嚥性肺炎			腎不全		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和6年	和歌山県 全 国	610 63,667	70.0 52.9	7	277 29,665	31.8 24.7	14
5年	和歌山県 全 国	575 60,190	65.0 49.7	7	313 30,208	35.4 24.9	9
4年	和歌山県 全 国	516 56,069	57.6 45.9	11	339 30,739	37.8 25.2	4
3年	和歌山県 全 国	483 49,488	53.3 40.3	8	290 28,688	32.0 23.4	8
2年	和歌山県 全 国	440 42,746	48.0 34.6	7	288 26,948	31.4 21.8	7
元年	和歌山県 全 国	418 40,385	45.5 32.6	8	298 26,644	32.5 21.5	5
平成30年	和歌山県 全 国	424 38,460	45.6 31.0	5	263 26,081	28.3 21.0	11
29年	和歌山県 全 国	376 35,791	40.0 28.7	9	259 25,135	27.6 20.2	11
28年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	279 24,620	29.4 19.7	8
27年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	278 24,561	29.0 19.6	3
26年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	285 24,776	29.5 19.8	4
25年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	287 25,101	29.4 20.0	5
24年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	284 25,107	28.9 19.9	4

注1：順位は高率からみた全国順位

注2：「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年以前の順位はつけていない。

令和6年

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その3）

		誤嚥性肺炎		腎不全	
		都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 香川県	94.7	1 高知県	38.8	
	2 島根県	78.9	2 北海道	37.7	
	3 熊本県	76.8	3 山形県	37.0	
低 率	45 埼玉県	40.0	45 愛知県	18.6	
	46 東京都	38.3	46 神奈川県	18.2	
	47 沖縄県	36.5	47 東京都	16.8	

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。