

カメムシ類に登録のある薬剤一覧

※農薬の有効成分、総使用回数等に十分注意してください。R8.5.22現在

適用作物	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数/ 使用回数	RACコード
かき	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日 / 3回以内	4A
	モスピラン顆粒水溶剤	2,000～4,000倍	前日 / 3回以内	4A
	アグロスリン水和剤	1,000～2,000倍	前日 / 3回以内	3A
	キックオフ顆粒水和剤	2,000倍	前日 / 3回以内	4A, 28
	キラップフロアブル	2,000倍	7日前 / 2回以内	2B
	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	前日 / 3回以内	4A
	モスピラン水溶剤	2,000～4,000倍	前日 / 3回以内	4A
	アーデントフロアブル	2,000倍	前日 / 3回以内	3A
	テッパン液剤	2,000倍	前日 / 2回以内	28
	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	3日前 / 3回以内	4A
	テルスターフロアブル	3,000～6,000倍	3日前 / 2回以内	3A
	アーデント水和剤	1,000倍	7日前 / 3回以内	3A
	アドマイヤー顆粒水和剤	5,000～10,000倍	7日前 / 3回以内	4A
	アドマイヤー水和剤	1,000倍	7日前 / 3回以内	4A
	ダントツ水溶剤	2,000～4,000倍	7日前 / 3回以内	4A
	スカウトフロアブル	1,500倍	7日前 / 5回以内	3A
	ロディー水和剤	1,500倍	7日前 / 3回以内	3A
	アディオオン乳剤	2,000～3,000倍	7日前 / 5回以内	3A
	アディオオンフロアブル	1,000～1,500倍	7日前 / 5回以内	3A
	テルスター水和剤	1,000～2,000倍	14日前 / 2回以内	3A
	アークリン水和剤	1,000倍	30日前 / 3回以内	3A
	エルサン水和剤40	800倍	30日前 / 4回以内	1B
	スミチオン水和剤40	800～1,000倍	30日前 / 3回以内	1B
	スミチオン乳剤	1,000倍	30日前 / 3回以内	1B
	パーマチオン水和剤	1,000～2,000倍	30日前 / 3回以内	1B, 3A
	マブリックEW	2,000倍	30日前 / 2回以内	3A
	マブリック水和剤20	2,000～4,000倍	30日前 / 2回以内	3A
かんきつ	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日 / 3回以内	4A
	ダントツ水溶剤	2,000～4,000倍	前日 / 3回以内	4A
	ロディー乳剤	2,000倍	7日前 / 4回以内	3A
	アグロスリン水和剤	2,000倍	7日前 / 3回以内	3A
	エルサン乳剤	1,000倍	14日前 / 2回以内	1B
	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	前日 / 3回以内	4A
	テルスター水和剤	1,000～2,000倍	前日 / 3回以内	3A
	テルスターフロアブル	3,000～6,000倍	前日 / 3回以内	3A
	アグロスリン乳剤	1,000～2,000倍	7日前 / 3回以内	3A
	モスピランSL液剤	2,000～4,000倍	14日前 / 3回以内	4A
	モスピラン顆粒水溶剤	2,000～4,000倍	14日前 / 3回以内	4A
	モスピラン水溶剤	2,000～4,000倍	14日前 / 3回以内	4A
	アドマイヤー顆粒水和剤	5,000～10,000倍	14日前 / 3回以内	4A
	アドマイヤーフロアブル	2,000～5,000倍	14日前 / 3回以内	4A
	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	14日前 / 3回以内	4A
	アディオオン乳剤	2,000倍	14日前 / 6回以内	3A
	ビルク水和剤	1,000～1,500倍	21日前 / 2回以内	3A, 10B
キウイ フルーツ	スタークル顆粒水溶剤	1,000～2,000倍	前日 / 3回以内	4A
	ダントツ水溶剤	2,000～4,000倍	前日 / 3回以内	4A
	アディオオン乳剤	2,000倍	7日前 / 5回以内	3A
	アドマイヤーフロアブル	2,000倍	前日 / 2回以内	4A
	アルバリン顆粒水溶剤	1,000～2,000倍	前日 / 3回以内	4A
	テルスターフロアブル	3,000倍	前日 / 2回以内	3A
	アグロスリン乳剤	1,000～2,000倍	7日前 / 3回以内	3A